

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS

Fr ENTOCORT® EN LAVEMENT

Budésonide en lavement

0,02 mg/mL après reconstitution

Veuillez lire la présente notice avant d'utiliser le lavement à garder ENTOCORT. Elle a été rédigée par le fabricant du lavement ENTOCORT pour vous aider à tirer le plus grand bienfait possible de ce médicament. Elle contient des renseignements généraux sur le lavement ENTOCORT qui devraient s'ajouter aux conseils plus spécifiques de votre médecin ou de votre pharmacien.

Pourquoi le lavement ENTOCORT est-il utilisé?

Le lavement ENTOCORT est utilisé pour traiter la colite ulcéreuse localisée dans le rectum et le gros intestin inférieur. La colite ulcéreuse est causée par une inflammation de la paroi intestinale.

Comment le lavement ENTOCORT agit-il?

ENTOCORT appartient à une famille de médicaments appelés glucocorticostéroïdes (un type de cortisone), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation.

Le lavement ENTOCORT réduit l'inflammation du gros intestin et du rectum. Après avoir préparé le lavement ENTOCORT, on l'administre directement dans le rectum.

Que dire à mon médecin avant ou pendant que j'utilise le lavement ENTOCORT?

Veuillez mentionner à votre médecin :

- Si vous présentez une réaction inhabituelle au budésonide, à tout autre ingrédient du lavement ENTOCORT (comprimé et liquide), comme le lactose et les propyl- et méthylparahydroxybenzoates, ou à tout autre médicament.
- Si vous présentez actuellement une infection (y compris la tuberculose évolutive) ou si vous contractez une infection.
- Si vous avez des problèmes de santé comme une maladie du foie, des problèmes intestinaux (obstructions, perforations, fistules), un diabète, un ulcère à l'estomac, de l'ostéoporose ou du glaucome.
- Tous les médicaments que vous prenez (y compris les stéroïdes) et les médicaments en vente libre.

- Si vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir, ou si vous allaitez.
- Si vos symptômes s'aggravent. N'arrêtez pas de prendre le lavement ENTOCORT jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

Le lavement ENTOCORT a été prescrit spécifiquement pour votre état actuel. Ne l'utilisez pas pour d'autres problèmes de santé à moins que votre médecin ne vous demande de le faire.

Ne donnez jamais de ce médicament à une autre personne.

Posologie

La posologie varie d'une personne à l'autre. Suivez les instructions du médecin attentivement. Elles peuvent être différentes des renseignements contenus dans cette notice.

Avant d'utiliser ENTOCORT ou tout autre lavement administré par introduction d'un tube rigide, les patients ayant subi une colostomie ou une iléostomie doivent consulter leur médecin.

Le lavement au budésonide doit être administré le soir, avant le coucher.


Le lavement au budésonide (0,02 mg/mL) consiste en un comprimé dispersable (I) et une solution (II).

- I. Chaque comprimé dispersable contient : 2,3 mg de budésonide, lactose, colorant (riboflavine-5-phosphate de sodium) et autres composants.
- II. 1 mL de solution contient : chlorure de sodium, agents de conservation (méthylparaben et propylparaben) et jusqu'à 1 mL d'eau purifiée.


Les données sur l'utilisation d'ENTOCORT en lavement chez les enfants sont limitées.

Préparation du lavement

1. Sans enlever le bouchon protecteur, dévissez l'adaptateur rectal du flacon.



2. Retirez un comprimé de l'emballage en papier d'aluminium et déposez-le dans le flacon. **NE PAS AVALER LE COMPRIMÉ.**




3. Revissez l'adaptateur rectal sur le flacon et assurez-vous que le bouchon protecteur est bien en place. Agitez vigoureusement le flacon pendant au moins 10 secondes ou jusqu'à ce que le comprimé soit complètement dissous et que la solution devienne jaunâtre. Le volume final est de 115 mL environ.




Vous trouverez un sac de plastique dans la boîte. Utilisez-le pour vous protéger la main pendant l'administration du lavement.

4. Étendez-vous sur le côté gauche. Agitez le flacon encore une fois avant de retirer le bouchon protecteur. Videz le contenu du flacon dans le rectum.
5. Tournez-vous sur le ventre. Restez dans cette position pendant 5 minutes.
6. Choisissez une position confortable pour dormir. Essayez de retenir le lavement le plus longtemps possible, de préférence toute la nuit.


Remarque : Le lavement au budésonide doit être administré immédiatement après sa préparation.



1. Placez la main dans le sac de plastique et saisissez le flacon.



2. Videz-en le contenu dans le rectum.



3. Après l'administration, retirez la main du sac de plastique en ramenant celui-ci par-dessus le flacon.

Surdosage

N'utilisez pas le lavement ENTOCORT plus souvent que le médecin l'a prescrit ou pendant une plus longue période. Si, par accident, vous prenez plus d'ENTOCORT que la dose prescrite à une seule occasion, aucun effet nuisible ne devrait survenir. Si vous prenez trop d'ENTOCORT pendant plus longtemps (pendant des mois ou plus), des effets secondaires peuvent survenir (consultez la section «Quels sont les effets indésirables?»). Si vous croyez que c'est peut-être votre cas, veuillez en discuter avec votre médecin.

Si vous oubliez de prendre une dose

Si, à l'occasion, vous oubliez de prendre une dose de lavement ENTOCORT, il n'est pas nécessaire de prendre la dose manquante. Vous n'avez qu'à prendre la prochaine dose, tel que prescrite.

Quels sont les effets indésirables?

Les effets secondaires qui peuvent être ressentis à l'emploi du lavement ENTOCORT sont habituellement légers. Cependant, assurez-vous de mentionner à votre médecin si l'un des effets suivants vous incommode :

Effets secondaires fréquents : troubles digestifs (p. ex. gaz dans l'estomac ou l'intestin), nausées, diarrhée, éruptions cutanées et/ou démangeaisons.

Effets secondaires peu fréquents : agitation, insomnie et, dans de très rares cas, réactions allergiques graves comportant des symptômes tels qu'éruptions cutanées, enflure des tissus et/ou difficulté à respirer.

Communiquez avec votre médecin si vous présentez d'autres effets inhabituels à l'emploi d'ENTOCORT en lavement.

Comment doit-on entreposer le lavement ENTOCORT?

Conservez les comprimés et le liquide à la température ambiante (inférieure à 30 °C).

Gardez toujours le lavement ENTOCORT, y compris les sacs de plastique, dans un endroit sûr, hors de la vue et de la portée des enfants.

Remarque :

Cette notice vous indique certains des cas où vous devez appeler le médecin, mais d'autres situations imprévisibles peuvent survenir. Rien dans la notice ne vous empêche de communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien pour lui poser des questions ou lui faire part de vos inquiétudes sur ENTOCORT en lavement.

REMARQUE : Ces RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS renferment l'information la plus récente qui était disponible au moment de l'impression de la présente notice. Veuillez consulter les Renseignements aux consommateurs sur le site www.astrazeneca.ca au cas où une version encore plus récente aurait été affichée.

Renseignements : 1-800-461-3787 (en français)
1-800-668-6000 (en anglais)

ENTOCORT® et le logo d'AstraZeneca sont des marques de commerce du groupe AstraZeneca.

© AstraZeneca 2000, 2009

AstraZeneca Canada Inc.
Mississauga, Ontario
L4Y1M4

Dernière révision : 2 mars 2009