



ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM®)
ਈਸੋਮੈਪਰਾਜੋਲ (esomeprazole)

**ਭਾਗ III:
ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ**

ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਤਪਾਦ “ਮੋਨੋਗਰਾਫ (Product Monograph)” ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM®) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਫਲੇਟ ਸਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM®) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਬਾਰੇ

- ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:**
ਸਿਆਣਿਆ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ/ਐਸਿਡ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :
- ਰੀਫਲਕਸ ਈਸੋਫੇਗਾਈਟਿਸ (reflux esophagitis) (ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ) ਅਤੇ ਰੀਫਲਕਸ ਈਸੋਫੇਗਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋਈਸੋਫੇਗੀਅਲ ਰੀਫਲਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼/ਬੀਮਾਰੀ (gastroesophageal reflux disease) (ਜੀਏਆਰਡੀ (GERD)) ਦੇ ਲੱਛਣ
 - ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਇਲੋਰੀ (*Helicobacter pylori*) ਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗੜ ਅਤੇ ਦੁਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਏਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ) ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਡੂਓਡੀਨਲ ਅਲਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਲਸਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
 - ਨੋਨਇਰੋਸੀਵ ਰੀਫਲਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (nonerosive reflux disease) (ਐਨਏਆਰਡੀ (NERD)) ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਛਾਤੀ ਵਲੋਂ ਗਲੇ ਵੱਲ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ (ਹਾਰਟਬਰਨ (heartburn)) ਅਤੇ ਕੌੜੇ/ਖੱਟੇ ਜੂਸ/ਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਲਕ ਪੈਣਾ (ਰੀਗਰਜੀਟੇਸ਼ਨ (regurgitation))
 - ਵਿਚਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਗਾਤਮਕ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜੋਲਿੰਗਰ-ਐਲੀਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ" (Zollinger-Ellison syndrome) ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਅਲਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਅਲਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਾਲੀ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਟਾਈਲਸੈਲੀਸੀਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਯਾਨਿ ਐਸਪਾਇਰਿਨ) (NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) or acetylsalicylic acid (i.e. Aspirin®)) ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ (1-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ/ਐਸਿਡ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- ਰੀਫਲਕਸ ਈਸੋਫੇਗਾਈਟਿਸ (reflux esophagitis) (ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ) ਅਤੇ ਰੀਫਲਕਸ ਈਸੋਫੇਗਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋਈਸੋਫੇਗੀਅਲ ਰੀਫਲਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼/ਬੀਮਾਰੀ (gastroesophageal reflux disease) (ਜੀਏਆਰਡੀ (GERD)) ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਨੋਨਇਰੋਸੀਵ ਰੀਫਲਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (nonerosive reflux disease) (ਐਨਏਆਰਡੀ (NERD)) ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਛਾਤੀ ਵਲੋਂ ਗਲੇ ਵੱਲ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ (ਹਾਰਟਬਰਨ (heartburn)) ਅਤੇ ਕੌੜੇ/ਖੱਟੇ ਜੂਸ/ਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਲਕ ਪੈਣਾ (ਰੀਗਰਜੀਟੇਸ਼ਨ (regurgitation))।

ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੰਸ਼/ਸਮੱਗਰੀ ਈਸੋਮੈਪਰਾਜੋਲ (esomeprazole) ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ/ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ (ਖਾਸ ਗੈਰਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਵੇਖੋ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਅੰਸ਼/ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ:
ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਈਸੋਮੈਪਰਾਜੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਟਰਾਈਹਾਈਡਰੇਟ (esomeprazole magnesium trihydrate) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੰਸ਼/ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਵੈਦਕ ਅੰਸ਼/ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ:
ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਵੈਦਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ (ਵਰਨਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ): ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਇਨ (cellulose microcrystalline), ਕਰੋਸਪੋਵੀਡੋਨ, (crospovidone), ਗਲਿਸਰਾਇਲ ਮੋਨੋਸਟੀਏਰੇਟ (glyceryl monostearate), ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ (hydroxypropyl cellulose), ਹਾਈਪਰੋਮੈਲੋਜ਼ (hypromellose), ਆਇਰਨ ਐਕਸਾਇਡ (iron oxide), ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਟੀਏਰੇਟ (magnesium stearate), ਮੈਥਾਕ੍ਰਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਥਾਕ੍ਰਿਲੇਟ ਕੋਪੋਲੀਮਰ (methacrylic acid ethylacrylate copolymer), ਪੋਲੀਏਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (polyethylene glycol), ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ (polysorbate), ਸਿਨਥੈਟਿਕ ਪੈਰਾਫਿਨ (synthetic paraffin), ਸੋਡੀਅਮ ਸਟੀਰਿਲ ਫੁਮਾਰੇਟ (sodium stearyl fumarate), ਸ਼ੂਗਰ ਸਫੀਅਰਜ਼ (sugar spheres), ਟੈਲਕ (talc), ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਇਡ (titanium dioxide), ਟਰਾਈਐਥਾਈਲ ਸਾਈਟਰੇਟ (triethyl citrate)।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਵੈਦਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ (ਵਰਨਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ): ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ (Citric acid), ਕਰੋਸਪੋਵੀਡੋਨ (crospovidone), ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (dextrose), ਗਲਿਸਰੋਲ ਮੋਨੋਸਟੀਏਰੇਟ (glycerol monostearate), ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ (hydroxypropyl cellulose), ਹਾਪਰੋਮੈਲੋਜ਼ (hypromellose), ਆਇਰਨ ਐਕਸਾਇਡ (iron oxide), ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਟੀਏਰੇਟ (magnesium stearate), ਮੈਥਾਕ੍ਰਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਥਾਕ੍ਰਿਲੇਟ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਟਾਈਪ ਸੀ (methacrylic acid ethylacrylate copolymer type C), ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ (polysorbate), ਸ਼ੂਗਰ ਸਫੀਅਰਜ਼ (sugar spheres), ਟੈਲਕ (talc), ਟਰਾਈਐਥਾਈਲ ਸਾਈਟਰੇਟ (triethyl citrate), ਜੈਨਥੋਨ ਗਮ (xanthan gum)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:
ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) 20 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) 40 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 60 ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) 10 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਵਿੱਚ 30 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਆਪਣੀ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ:

- ਲੱਛਣ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀ (intestine) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਨਿਗਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਟਾ, ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ, ਜਾਂ ਕਾਲਾ (ਖੂਨ ਵਾਲਾ) ਪਖਾਨਾ
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸੋਮੈਪਰਾਜੋਲ (esomeprazole) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਨਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM), ਉੱਲੀ (fungal) ਦੇ ਵਿਗਾੜ (ਇਟਰਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਕੀਟੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਵੋਰੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ (itraconazole, ketoconazole, voriconazole)), ਜਿਅਾਦਾ ਚਿੱਤਾ (ਡਾਇਜੀਪੈਮ (diazepam)), ਮਿਰਗੀ (ਫੋਨੀਟੋਇਨ (phenytoin)), ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ (ਸੀਸਾਪਰਾਇਡ (cisapride*)), ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਿਆ ਖੂਨ-ਸੰਚਾਰ (ਸਿਲੋਸਟਾਜੋਲ*), ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਡਿਜੌਕਸਿਨ), ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਰਿਫੈਮਪਿਨ), ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨਜ਼ ਵੌਰਟ (ਹਾਈਪੋਰਿਕਮ ਪਰਫੋਰਮੇਟਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਯਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ (ਵਾਰਫਾਰਿਨ ਜਾਂ ਕੋਮਾਰਿਨ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਸ (warfarin or coumarin derivaitvs)), ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM), ਹੈੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. (HIV) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਐਟਾਜਨਾਵੀਰ (atazanavir) ਅਤੇ ਨੈਲਫੀਨਾਵੀਰ (nelfinavir) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੁੱਦੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਸਿਯੋਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੋਰਾਨ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੋਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

* ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ:
ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੋਲੀ :
ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੱਕਿਆਂ (pellets) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਬਾਏ ਹੋਏ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥਾਲ (rinse) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਜਾਓ।

ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ :
ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ (੧੫ ਮਿ.ਲੀ.) ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਾਉ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਾੜਾ ਪੀਲਾ ਦਿਸੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਉ ਅਤੇ ੩੦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਮਿਲਾਉ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਪੀ ਜਾਓ।

ਆਮ ਖੁਰਾਕ:
ਸਿਮਾਣੇ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਖੁਰਾਕ 2 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20 ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨੈਕਸੀਅਮ

(NEXIUM) 20 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੌਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨੂੰ **ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਇਲੋਰੀ (Helicobacter pylori)** ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) 1-2-3[®] ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਦੀ ਹੈ (ਨੈਕਸੀਅਮ ਅਤੇ ਦੋ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ)। ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਰੀ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਘੋਖਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ **ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਇਲੋਰੀ (Helicobacter pylori)** ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਲੈਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗੋ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਨਈਆਰਡੀ (NERD) ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਇਲਾਜ (ਮਿੰਗ 'ਤੇ) ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਐਨਈਆਰਡੀ (NERD) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰਟਬਰਨ (heartburn) ਜਾਂ ਰੀਗਰਜੀਟੇਸ਼ਨ (regurgitation) ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਉਥਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੱਚੇ (1-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ)
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ/ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੌਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ।

ਬੱਚੇ (1-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ)
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ 10 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਹੈ (1 ਪੈਕਟ) ਜਾਂ 20 ਮਿਲੀਗਰਾਮ (2 ਪੈਕਟ) ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ।

ਬੱਚੇ (12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ)
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ 20 ਜਾਂ 40 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 2-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ।

ਸੰਮਤੀ/ਪਾਲਣਾ ਪੈਕ (compliance pack) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ:
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਚਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਇਲੋਰੀ (*Helicobacter pylori*) ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਲਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਉਠਾ ਵਾਲੇ (blister) ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਓ (ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਗੋਲੀਆਂ) ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਕ:

ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਬੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ।

ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਖ਼ਰਾਕ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ/ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਓ। ਜੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਦੁਗਣੀ ਖ਼ਰਾਕ ਨਾ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM), ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਜੋ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ:

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ: ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਪੇਚਸ, ਸਿਰ-ਪੀੜ

ਅਸਧਾਰਨ : ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਠੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਜੱਲਣ/ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਣ/ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ

ਵਿਰਲੇ : ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਰਨਾ/ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਲਾਜ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ (ਖੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਲੇ) ਦਸਤ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੇਟ-ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬੈਕਟੀਰਿਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕਲੋਸਟਰੀਡਿਅਮ ਡਿਫਿਸਿਲਿਸ)। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਪਰਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

ਲੱਛਣ/ਪਰਭਾਵ	ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ	ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਵਿਰਲੇ (ਬਾਰਬਾਰਤਾ 10,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਾਰਬਾਰ ਹੈ ਪਰ 1,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ)		

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

ਲੱਛਣ/ਪਰਭਾਵ	ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ	ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਪਾਕੀ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਾਜ)	√	
ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ	√	
ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ	√	
ਬੋਰੇਨੀ	√	
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ	√	
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ	√	
ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ, ਐਨਾਫਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ/ਸਦਮਾਂ)	√	√
ਪੀਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ	√	
ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਜ਼ ਦਾ ਘੱਟਣਾ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ⁸)	√	
ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜਸ (ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)	√	√
ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ	√	
ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ	√	
ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ	√	
ਬੀਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ	√	
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ (ਬਾਰਬਾਰਤਾ 10,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ)		
ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਛਾਲੇ, ਅਲਸਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਖਮ)	√	√
ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ/ਹਮਲਾ	√	
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਰਮ ਹੋਣਾ/ਵਹਿਮ	√	
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਜਿਗਰ ਕਾਰਜ	√	
ਘਟੀ ਚੇਤਨਤਾ	√	
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੋਜਸ	√	
ਪੀਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ	√	
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ	√	
ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ	√	

⁸ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ:

- ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ (blister strips) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚਲੀ ਨਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ।
- ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਸੰਮਤੀ ਪੈਕ (compliance pack) ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ (15 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਘਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਮ, ਸਿਲੀਆਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ।
- ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਨੂੰ ਪੈਕ ਉੱਤੇ ਅੰਕਤ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

ਸਿਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ:

- * ਐਨਲਾਈਨ www.healthcanada.gc/medeffect 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
- * ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 866-234-2345 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
- * ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
 - ਮੁਫਤ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 866-678-6789 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ
 - ਆਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਕਰੋ:
Canada Vigilance Program
Health Canada
Postal Locator 0701D
Ottawa ON K1A 0K9

ਪੋਸਟੇਜ ਕੋਡ ਲੇਬਲਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੈੱਡ-ਇਫੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.healthcanada.gc/medeffect 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੋਟ : ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈੱਟ/ਪਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈੱਟ/ਪਰਚਾ ਅਤੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰੋਡਕਟ ਮੋਨੋਗਰਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ

www.astrazeneca.ca ਉੱਤੇ “Patients with Prescriptions” ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ (AstraZeneca Canada Inc.) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗਾਹਕ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ : 1 (800) 668-6000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ : 1 (800) 461-3787 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪੌਫਲੇਟ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ (AstraZeneca Canada Inc., Mississauga, Ontario L4Y 1M4) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੇਜ਼ਾਬ/ਐਸਿਡ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ (AstraZeneca Canada Inc.) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਨੈਕਸੀਅਮ (NEXIUM®), ਨੈਕਸੀਅਮ 1-2-3A® (NEXIUM 1-2-3A®), ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਲੋਗੋ (AstraZeneca logo), ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਗਰੁੱਪ (AstraZeneca Group) ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰ ਮਾਰਕ/ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਐਸਪੀਰਿਨ (ASPIRIN®) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਬੇਅਰ ਏਜੀ (Bayer AG) ਲੇਵੇਰਕੁਸੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਨ।

© AstraZeneca 2007

ਆਖਰੀ ਸੋਧ: ਅਕਤੂਬਰ 20, 2010