

Renseignements destinés aux patient·e·s

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **FASENRA**® et Pr **FASENRA PEN**®
benralizumab

Ces renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui prendra ou recevra **FASENRA**. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de **FASENRA**, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

À quoi sert **FASENRA** :

Asthme

FASENRA est un médicament utilisé en plus d'autres médicaments contre l'asthme chez les adultes atteints d'asthme éosinophilique sévère. L'asthme survient lorsque les muscles entourant les petites voies respiratoires deviennent tendus, enflés et irrités. Les symptômes se produisent de façon intermittente et comprennent l'essoufflement, la respiration sifflante, une sensation d'oppression dans la poitrine et la toux. L'asthme éosinophilique sévère est un type d'asthme caractérisé par une hausse du nombre de globules blancs dans le sang ou les poumons. Cela peut entraîner des symptômes d'asthme qui peuvent s'aggraver ou augmenter le nombre de crises d'asthme.

FASENRA peut aider à réduire le nombre de crises d'asthme.

FASENRA n'est pas utilisé pour traiter les problèmes respiratoires d'apparition soudaine.

Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA)

FASENRA est utilisé en plus d'autres médicaments pour traiter la GEPA chez les adultes. La GEPA est caractérisée par un taux élevé de globules blancs dans le sang et les tissus, et par une inflammation des vaisseaux sanguins. Cette maladie touche le plus souvent les poumons et les sinus, mais aussi d'autres organes tels que la peau, le cœur et les reins.

FASENRA peut réduire les symptômes et prévenir les poussées de GEPA.

Comment fonctionne **FASENRA :**

FASENRA contient la substance active, le benralizumab, un anticorps monoclonal. **FASENRA** agit en se fixant aux globules blancs appelés éosinophiles. Des taux élevés d'éosinophiles jouent un rôle dans l'asthme et la GEPA. **FASENRA** réduit le nombre d'éosinophiles dans le sang et les poumons.

Les ingrédients de **FASENRA sont :**

Ingrédient médicamenteux : benralizumab

Ingrédients non médicamenteux : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, α,α -tréhalose dihydraté, polysorbate 20 et eau

FASENRA se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Solution pour injection

Chaque seringue préremplie ou auto-injecteur à usage unique contient 30 mg de benralizumab dans 1 mL de solution.

N'utilisez pas FASENRA dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique au benralizumab ou à l'un des autres ingrédients contenus dans ce médicament. Consultez votre médecin si l'une de ces situations s'applique à vous.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser FASENRA, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- Si vous présentez des symptômes d'une réaction allergique, y compris à d'autres médicaments de ce genre (anticorps monoclonaux) car ils peuvent causer des réactions allergiques graves lorsqu'ils sont injectés dans l'organisme (voir **Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à FASENRA?**). Des réactions allergiques graves sont survenues chez des personnes recevant FASENRA.
- Si vous avez une infection parasitaire ou si vous habitez une région où les infections parasitaires sont fréquentes, ou encore si vous voyagez dans une telle région. FASENRA peut affaiblir votre capacité à combattre certains types d'infections parasitaires.
- Si vous estimez que vos symptômes d'asthme s'aggravent pendant le traitement par FASENRA.

Autres mises en garde :

Effet de l'arrêt du traitement par FASENRA

N'arrêtez pas de recevoir les injections de FASENRA sauf sur l'avis de votre médecin. L'interruption ou l'arrêt du traitement par FASENRA peut entraîner l'aggravation de vos symptômes d'asthme/de la GEPA ou causer une crise d'asthme/récidive de la GEPA.

Autres médicaments

N'arrêtez pas brusquement de prendre les autres médicaments prescrits pour votre maladie et ne modifiez pas leur dose une fois que vous avez commencé le traitement par FASENRA. La prise de ces médicaments (particulièrement les corticostéroïdes) doit être arrêtée progressivement, sous la supervision directe du médecin.

Grossesse et allaitement

- Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou prévoyez le devenir, avisez votre médecin avant d'utiliser ce médicament. Il est préférable de ne pas utiliser FASENRA pendant la grossesse. On ignore si FASENRA peut être nocif pour votre bébé à naître.
- Si vous tombez enceinte pendant le traitement par FASENRA ou au cours des 4 mois suivant l'arrêt du traitement par FASENRA, avisez immédiatement votre médecin.
- On ignore si les ingrédients de FASENRA passent dans le lait maternel. Si vous allaitez ou prévoyez le faire, vous devez aviser votre médecin avant de recevoir le traitement par FASENRA.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Comment utiliser FASENRA :

Utilisez toujours ce médicament en suivant exactement les directives de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin, infirmière ou pharmacien en cas de doute.

FASENRA est administré sous forme d'injection juste sous la peau (sous-cutanée).

Votre médecin et vous devrez décider si vous vous injecterez FASENRA vous-même.

Vous ou votre aidant devrez recevoir une formation sur la bonne manière de préparer et d'injecter FASENRA. Lisez attentivement le Mode d'emploi avant d'utiliser FASENRA. Consultez le Mode d'emploi de la seringue préremplie FASENRA ou le Mode d'emploi de l'auto-injecteur FASENRA (FASENRA PEN).

Dose habituelle :

Asthme

La posologie recommandée est de 30 mg (une injection) toutes les 4 semaines pour les 3 premières injections, puis toutes les 8 semaines par la suite.

GEPA

La posologie recommandée est de 30 mg (une injection) toutes les 4 semaines.

Surdose :

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité de FASENRA, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, ou composez le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de signes ou de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous manquez l'administration d'une dose de FASENRA, communiquez dès que possible avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires possibles de l'utilisation de FASENRA :

FASENRA peut causer des effets secondaires, même si ce ne sont pas tous les patients qui en présenteront.

Ce ne sont pas là tous les effets secondaires que vous pourriez présenter en prenant FASENRA. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous, avisez votre professionnel de la santé.

Effets secondaires courants (peuvent toucher jusqu'à 1 patient sur 10)

Réactions allergiques

Les personnes recevant FASENRA peuvent avoir des réactions allergiques. Ces réactions pourraient survenir au cours des minutes ou des heures qui suivent l'injection, mais parfois, les symptômes peuvent se manifester plusieurs jours après.

Les symptômes peuvent comprendre les suivants :

- Enflure du visage, des paupières, des lèvres, de la langue ou de la bouche
- Difficulté à respirer, respiration devenant très sifflante, toux, serrement de la poitrine
- Évanouissement, étourdissements, sensation de tête légère (en raison d'une chute de la tension artérielle)
- Urticaire
- Éruptions cutanées

Obtenez des soins médicaux immédiatement si vous pensez avoir une réaction.

Les autres effets secondaires courants qui peuvent survenir avec FASENRA sont les suivants :

- Maux de tête
- Maux de gorge
- Fièvre
- Réaction au point d'injection (p. ex. douleur, rougeur, démangeaisons, enflure près de l'endroit où l'injection a été administrée)

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire inconfortable qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (canada.ca/medicament-instrument-declaration) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur, ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Conservation :

- Garder hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser ce médicament après la date limite indiquée sur l'étiquette. La date limite correspond au dernier jour du mois indiqué.
- Conserver dans l'emballage d'origine pour protéger le médicament de la lumière.
- Conserver au réfrigérateur (2 à 8 °C).
- FASENRA peut être conservé à température ambiante sans dépasser 25 °C pendant une période allant jusqu'à 14 jours. Une fois sorti du réfrigérateur, FASENRA doit être utilisé dans les 14 jours ou jeté.
- Ne pas agiter ni congeler, et ne pas exposer à la chaleur.

Pour en savoir plus sur FASENRA :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document est disponible sur le site Web de la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) ou le site Web du fabricant (www.astrazeneca.ca/fr), ou encore en composant le 1-800-461-3787.
- Ces Renseignements destinés aux patient·e·s présentent l'information la plus à jour au moment de l'impression. La version la plus récente est disponible au www.astrazeneca.ca/fr.

Cette notice a été préparée par AstraZeneca Canada Inc., Mississauga (Ontario) L4Y 1M4.

Date d'approbation : 2025-07-18

FASENRA®, FASENRA PEN® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.



Mode d'emploi – Seringue préremplie

Pr **FASENRA**[®]

benralizumab

Seringue préremplie à usage unique

Votre professionnel de la santé doit vous montrer, à vous ou à votre aidant, comment utiliser correctement la seringue préremplie FASENRA avant que vous commenciez à vous en servir.

Lisez ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser la seringue préremplie FASENRA et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Il pourrait y avoir de nouveaux renseignements. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre professionnel de la santé au sujet de votre état de santé ou de votre traitement.

Si vous ou votre aidant avez des questions, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Renseignements importants

Conservez FASENRA au réfrigérateur entre 2 et 8 °C dans sa boîte jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. FASENRA peut être conservé à température ambiante sans dépasser 25 °C pendant une période allant jusqu'à 14 jours. Une fois sorti du réfrigérateur, FASENRA doit être utilisé dans les 14 jours ou jeté.

Ne pas utiliser la seringue préremplie FASENRA si :

- elle a été congelée
- elle a été échappée ou endommagée
- le sceau de sécurité sur la boîte a été brisé
- la date de péremption (EXP) est passée

Ne pas :

- agiter la seringue préremplie
- partager ni réutiliser la seringue préremplie

Si l'une des situations ci-dessus se présente, jeter la seringue dans un contenant résistant à la perforation et destiné aux objets pointus et tranchants et utiliser une nouvelle seringue préremplie.


Chaque seringue préremplie FASENRA contient 1 dose de FASENRA pour un usage unique.

Garder FASENRA et tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.

Comment utiliser la seringue préremplie FASENRA


Ne pas retirer le capuchon de l'aiguille avant d'avoir atteint l'étape 6 de ces instructions et d'être prêt à injecter FASENRA.

Ne pas toucher aux pinces d'activation du protecteur d'aiguille pour ne pas activer le dispositif de sécurité (protecteur d'aiguille) trop tôt.



Étape 1 – Rassembler le matériel

- 1 seringue préremplie FASENRA tout juste sortie du réfrigérateur
- 1 tampon d'alcool
- 1 tampon d'ouate ou de gaze
- 1 contenant résistant à la perforation et destiné aux objets pointus et tranchants
(Voir l'étape 9 – Jeter la seringue préremplie après son utilisation)



Seringue préremplie



Tampon d'alcool



Tampon d'ouate ou de gaze



Contenant destiné aux objets pointus et tranchants

Étape 2 – Se préparer à l'utilisation de la seringue préremplie

Vérifier la date de péremption (EXP). Ne pas utiliser la seringue si la date de péremption est passée.

Laisser FASENRA à température ambiante de 20 à 25 °C pendant environ 30 minutes avant de faire l'injection.



Ne pas réchauffer la seringue préremplie d'une autre façon. Par exemple, ne pas la réchauffer au micro-ondes ni dans l'eau chaude et ne pas la mettre à proximité d'autres sources de chaleur.

Une fois sorti du réfrigérateur, FASENRA doit être utilisé dans les 14 jours.


Étape 3 – Vérifier le liquide

Saisir le corps de la seringue (et **non** le piston) pour retirer la seringue préremplie.

Vérifier le liquide par la fenêtre de visualisation. Le liquide doit être limpide et incolore à jaune. Il peut contenir de petites particules blanches.

Ne pas injecter FASENRA si le liquide est trouble, s'il a changé de couleur ou s'il contient de grosses particules.

Il peut y avoir une petite bulle d'air dans le liquide. C'est normal. Vous n'avez rien à faire.



Étape 4 – Choisir le point d'injection

Le point d'injection recommandé est le devant de la cuisse.


Vous pouvez également utiliser la partie inférieure de l'abdomen.

Ne pas injecter :

- dans une zone de 5 cm autour du nombril
- là où la peau est sensible, meurtrie, squameuse ou dure
- dans les cicatrices ou la peau abîmée
- à travers les vêtements

Un aidant peut vous faire une injection dans le haut du bras, la cuisse ou l'abdomen. **Ne pas** essayer de vous injecter vous-même le produit dans le bras.

Pour chaque injection, choisir un nouvel endroit situé à au moins 3 cm du dernier point d'injection.




Étape 5 – Préparer le point d'injection

Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.

Nettoyer le point d'injection à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool en effectuant un mouvement circulaire. Laisser sécher à l'air.

Ne pas toucher à la zone nettoyée avant de faire l'injection.

Ne pas éventer la zone nettoyée ni souffler dessus.



Étape 6 – Retirer le capuchon de l'aiguille

Tenir le corps de la seringue d'une main et retirer le capuchon de l'autre main avec précaution, d'un seul coup.

Ne pas tenir le piston ou la tête du piston en retirant le capuchon de l'aiguille.


Mettre le capuchon de l'aiguille de côté et le jeter plus tard.

Il pourrait y avoir une goutte de liquide au bout de l'aiguille. C'est normal.

Ne pas utiliser la seringue si elle a été échappée sans le capuchon de l'aiguille en place ou si l'aiguille est endommagée ou sale.

Ne pas toucher à l'aiguille et ne pas la mettre en contact avec quelque surface que ce soit.

Passer immédiatement aux étapes suivantes.



Étape 7 – Injecter FASENRA

Suivre les instructions de votre professionnel de la santé relatives à l'injection.



Tenir la seringue préremplie dans une main comme le montre la figure.

Utiliser l'autre main pour pincer délicatement la peau à l'endroit où vous voulez faire l'injection. Cela crée une surface plus ferme.

Ne pas appuyer sur le piston tant que l'aiguille n'est pas complètement insérée dans la peau.


Ne jamais tirer sur le piston.

Injecter FASENRA en suivant les étapes illustrées aux figures **a**, **b** et **c**.




Insérer l'aiguille dans la peau pincée d'un mouvement vif et rapide.

Insérer l'aiguille avec un angle de 45 degrés.



Utiliser le pouce pour pousser sur la tête du piston.

Continuer à pousser jusqu'à ce qu'il soit enfoncé aussi loin que possible. Ceci vous assure que tout le médicament a été injecté.



Garder le pouce sur la tête du piston enfoncé pendant que vous sortez l'aiguille de la peau.

Relâcher doucement le piston jusqu'à ce que le protecteur d'aiguille recouvre l'aiguille.


Étape 8 – Vérifier le point d'injection

Il peut y avoir une petite quantité de sang ou de liquide au point d'injection. C'est normal.

Exercer une légère pression sur la peau avec un tampon d'ouate ou de gaze jusqu'à ce que le saignement cesse.

Ne pas frotter le point d'injection.

Recouvrir le point d'injection avec un petit pansement, au besoin.




Étape 9 – Jeter la seringue préremplie après son utilisation

- Chaque seringue préremplie contient une dose unique de FASENRA et **ne peut pas être réutilisée**.
- Placer la seringue préremplie utilisée dans un contenant résistant à la perforation et **destiné aux objets pointus et tranchants** tout de suite après son utilisation.

Ne pas jeter la seringue préremplie dans les ordures ménagères.

Ne pas remplacer le capuchon de l'aiguille.

Jeter le capuchon et les autres fournitures utilisées dans les ordures ménagères.



Directives concernant la mise au rebut

Jeter le contenant plein selon les directives de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien.

Ne pas jeter le contenant destiné aux objets pointus et tranchants dans les ordures ménagères.

Ne pas recycler le contenant destiné aux objets pointus et tranchants.

FASENRA® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.



Mode d'emploi – Auto-injecteur

Pr **FASENRA PEN®**

benralizumab

Auto-injecteur à usage unique

Votre professionnel de la santé doit vous montrer, à vous ou à votre aidant, comment utiliser correctement l'auto-injecteur FASENRA PEN avant que vous commenciez à vous en servir.

Lisez ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser FASENRA PEN et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Il pourrait y avoir de nouveaux renseignements. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre professionnel de la santé au sujet de votre état de santé ou de votre traitement.

Si vous ou votre aidant avez des questions, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Renseignements importants

Conservez FASENRA® au réfrigérateur entre 2 et 8 °C dans sa boîte jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. FASENRA peut être conservé à température ambiante sans dépasser 25 °C pendant une période allant jusqu'à 14 jours. Une fois sorti du réfrigérateur, FASENRA doit être utilisé dans les 14 jours ou jeté.

Ne pas utiliser l'auto-injecteur FASENRA PEN si :

- il a été congelé
- il a été échappé ou endommagé
- le sceau de sécurité sur la boîte a été brisé
- la date de péremption (EXP) est passée

Ne pas :

- agiter l'auto-injecteur FASENRA PEN
- partager ni réutiliser l'auto-injecteur FASENRA PEN



Si l'une des situations ci-dessus se présente, jeter l'auto-injecteur FASENRA PEN dans un contenant résistant à la perforation et destiné aux objets pointus et tranchants et utiliser un nouvel auto-injecteur FASENRA PEN.

Chaque auto-injecteur FASENRA PEN contient 1 dose de FASENRA pour un usage unique.

Garder FASENRA et tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.

Comment utiliser votre auto-injecteur FASENRA PEN

Ne pas retirer le capuchon de l'aiguille avant d'avoir atteint l'étape 6 de ces instructions et d'être prêt à injecter FASENRA.



Étape 1 – Rassembler le matériel

- 1 auto-injecteur FASENRA PEN tout juste sorti du réfrigérateur
- 1 tampon d'alcool
- 1 tampon d'ouate ou de gaze
- 1 contenant résistant à la perforation et destiné aux objets pointus et tranchants
(Voir l'étape 10 – Jeter l'auto-injecteur FASENRA PEN de façon sécuritaire après son utilisation)



FASENRA PEN



Tampon d'alcool



Tampon d'ouate ou
de gaze



Contenant destiné
aux objets pointus et
tranchants

Étape 2 – Se préparer à l'utilisation de l'auto-injecteur FASENRA PEN

Vérifier la date de péremption (EXP). Ne pas utiliser l'auto-injecteur si la date de péremption est passée.

Laisser FASENRA à température ambiante de 20 à 25 °C pendant environ 30 minutes avant de faire l'injection.


Ne pas réchauffer l'auto-injecteur FASENRA PEN d'une autre façon. Par exemple, ne pas le réchauffer au micro-ondes ni dans l'eau chaude, et ne pas le mettre à proximité d'autres sources de chaleur.

Une fois sorti du réfrigérateur, FASENRA doit être utilisé dans les 14 jours.

Ne pas retirer le capuchon avant d'avoir atteint l'étape 6.



Étape 3 – Vérifier le liquide




Examiner le liquide à travers la fenêtre de visualisation de l'auto-injecteur FASENRA PEN. Le liquide doit être limpide et incolore à jaune. Il peut contenir de petites particules blanches.

Ne pas injecter FASENRA si le liquide est trouble, s'il a changé de couleur ou s'il contient de grosses particules.

Il peut y avoir une petite bulle d'air dans le liquide. C'est normal. Vous n'avez rien à faire.

Étape 4 – Choisir le point d'injection



Le point d'injection recommandé est le devant de la cuisse. Vous pouvez également utiliser la partie inférieure de l'abdomen.


Ne pas injecter :

- dans une zone de 5 cm autour du nombril
- là où la peau est sensible, meurtrie, squameuse ou dure
- dans les cicatrices ou la peau abîmée
- à travers les vêtements

Un aidant peut vous faire une injection dans le haut du bras, la cuisse ou l'abdomen. **Ne pas** essayer de vous injecter vous-même le produit dans le bras.

Pour chaque injection, choisir un nouvel endroit situé à au moins 3 cm du dernier point d'injection.

Étape 5 – Préparer le point d'injection




Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.

Nettoyer le point d'injection à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool en effectuant un mouvement circulaire. Laisser sécher à l'air.

Ne pas toucher à la zone nettoyée avant de faire l'injection.

Ne pas éventer la zone nettoyée ni souffler dessus.

Étape 6 – Retirer le capuchon



Tenir l'auto-injecteur FASENRA PEN d'une main. Retirer le capuchon de l'autre main avec précaution, d'un seul coup.

Mettre le capuchon de côté et le jeter plus tard.

Le protecteur d'aiguille vert est maintenant exposé. Il est là pour vous empêcher de toucher à l'aiguille.

Ne pas essayer de toucher l'aiguille ou de pousser sur le protecteur d'aiguille avec votre doigt.

Ne pas essayer de remettre le capuchon sur l'auto-injecteur FASENRA PEN. Cela pourrait déclencher l'injection trop tôt ou endommager l'aiguille.

Effectuer les étapes suivantes tout de suite après avoir retiré le capuchon.


Étape 7 – Injecter FASENRA

Suivre les instructions de votre professionnel de la santé relatives à l'injection. Vous pouvez pincer délicatement le point d'injection ou faire l'injection sans pincer la peau.

Injecter FASENRA en suivant les étapes illustrées aux figures **a**, **b**, **c** et **d**.


Tenir l'auto-injecteur FASENRA PEN en place jusqu'à la fin de l'injection.

Ne pas changer la position de l'auto-injecteur FASENRA PEN une fois l'injection commencée.




Positionner l'auto-injecteur FASENRA PEN sur le point d'injection

Placer le protecteur d'aiguille de l'auto-injecteur FASENRA PEN à plat contre la peau (angle de 90 degrés). S'assurer que la fenêtre de visualisation est visible.




Appuyer fermement.

Vous entendrez un «clic». Le «clic» indique que l'injection a débuté. Le piston vert se déplacera vers le bas de la fenêtre de visualisation pendant l'injection.



Maintenir fermement enfoncé pendant 15 secondes.


Vous entendrez un second «clic». Le second «clic» indique que l'injection est terminée. Le piston vert remplira la fenêtre de visualisation.



Soulever l'auto-injecteur FASENRA PEN à la verticale.

Le protecteur d'aiguille glissera vers le bas et se verrouillera en place sur l'aiguille.


Étape 8 – Vérifier la fenêtre de visualisation




Vérifier la fenêtre de visualisation pour s'assurer que tout le liquide a été injecté.

Si le piston vert ne remplit pas la fenêtre de visualisation, vous n'avez peut-être pas reçu la dose complète. Si cela se produit ou si tout autre problème survient, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.


**Avant
l'injection**



**Après
l'injection**



Étape 9 – Vérifier le point d'injection



Il peut y avoir une petite quantité de sang ou de liquide au point d'injection. C'est normal.

Exercer une légère pression sur la peau avec un tampon d'ouate ou de gaze jusqu'à ce que le saignement cesse.

Ne pas frotter le point d'injection.

Recouvrir le point d'injection avec un petit pansement, au besoin.

Étape 10 – Jeter l'auto-injecteur FASENRA PEN de façon sécuritaire après son utilisation



- Chaque auto-injecteur FASENRA PEN contient une dose unique de FASENRA et **ne peut pas être réutilisé**.
- Jeter l'auto-injecteur FASENRA PEN dans un contenant résistant à la perforation et **destiné aux objets pointus et tranchants** tout de suite après son utilisation.

Ne pas jeter FASENRA PEN dans les ordures ménagères.

Jeter le capuchon et les autres fournitures utilisées dans les ordures ménagères.

Directives concernant la mise au rebut

Jeter le contenant plein selon les directives de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien.

Ne pas jeter le contenant destiné aux objets pointus et tranchants dans les ordures ménagères.

Ne pas recycler le contenant destiné aux objets pointus et tranchants.

FASENRA[®], FASENRA PEN[®] et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

