

IMPORTANT : À LIRE

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS

ZOMIG® POUR VAPORISATION NASALE zolmitriptan

La présente notice constitue la troisième et dernière partie d'une monographie publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de ZOMIG pour vaporisation nasale et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Elle n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ZOMIG pour vaporisation nasale. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

ATTENTION : Ce médicament a été prescrit uniquement pour VOUS. Seul un médecin est en mesure de déterminer quelles personnes peuvent le prendre en toute sécurité. N'en donnez jamais à une autre personne, même si ses symptômes sont les mêmes que les vôtres, car ce médicament pourrait lui être nocif.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Ce médicament s'appelle ZOMIG pour vaporisation nasale. Seul un médecin peut le prescrire. La décision d'utiliser ZOMIG pour vaporisation nasale doit être prise conjointement avec votre médecin, compte tenu de vos préférences et de votre état de santé. Si vous présentez des facteurs de risque de maladie cardiaque (hypertension, taux élevé de cholestérol, obésité, diabète, tabagisme, antécédents familiaux prononcés de maladie cardiaque, ou si vous êtes une femme ménopausée ou un homme de plus de 40 ans), dites-le à votre médecin. Ce dernier doit d'abord évaluer votre prédisposition aux maladies cardiaques afin de déterminer si ZOMIG pour vaporisation nasale vous convient.

RAISONS D'UTILISER CE MÉDICAMENT

ZOMIG pour vaporisation nasale appartient à une famille de médicaments antimigraineux appelés agonistes des récepteurs 5-HT₁. ZOMIG pour vaporisation nasale est utilisé pour soulager la migraine et les symptômes qui y sont associés.

ZOMIG pour vaporisation nasale ne doit pas être pris de façon continue pour prévenir les crises de migraine ou en réduire le nombre. Ne prenez ZOMIG pour vaporisation nasale qu'au moment où vous souffrez d'une migraine.

EFFETS DE CE MÉDICAMENT

On estime que la migraine est causée par une dilatation des vaisseaux sanguins situés dans la tête. ZOMIG pour vaporisation nasale provoque un resserrement des vaisseaux et soulage la douleur et les autres symptômes associés à la migraine.

CIRCONSTANCES OÙ IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER CE MÉDICAMENT

Il ne faut pas utiliser ZOMIG pour vaporisation nasale si :

- vous êtes allergique au zolmitriptan ou à l'un des autres ingrédients de ZOMIG pour vaporisation nasale (voir «INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX IMPORTANTS»);
- vous avez des antécédents, des signes ou des symptômes d'une maladie cardiaque;
- vous ressentez des douleurs à la poitrine, soit à l'effort physique, soit au repos (ce dernier trouble est connu sous le nom d'angor de Prinzmetal);
- vous faites de l'hypertension grave ou non maîtrisée;
- vous prenez ou avez pris récemment (dans les 24 heures) un médicament contenant de l'ergotamine ou un agent semblable, ou un autre triptan pour traiter les migraines;
- vous avez un autre type de mal de tête, différent d'une crise de migraine;
- vous prenez ou avez pris récemment (dans les 2 dernières semaines) un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO).

INGRÉDIENT MÉDICINAL

Chaque vaporisateur nasal ZOMIG contient soit 2,5 mg, soit 5 mg de zolmitriptan en dose unitaire.

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX IMPORTANTS

Chaque vaporisateur nasal ZOMIG contient les ingrédients inactifs suivants : acide citrique, eau et phosphate disodique (dodécahydraté ou dihydraté).

FORMES PHARMACEUTIQUES

ZOMIG pour vaporisation nasale est offert dans un dispositif à usage unique de plastique bleu, doté d'un capuchon protecteur gris. Chaque vaporisation libère 2,5 ou 5 mg de médicament.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Si vous répondez «OUI» à l'une des questions suivantes ou si vous n'êtes pas certain de la réponse, consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre ZOMIG pour vaporisation nasale :

- Êtes-vous enceinte, pensez-vous l'être ou essayez-vous de le devenir? Utilisez-vous un moyen de contraception inadéquat? Est-ce que vous allaitez?
- Ressentez-vous ou avez-vous déjà senti des douleurs à la poitrine ou de l'oppression dans la poitrine (pouvant ou non s'étendre au cou, à la mâchoire ou au haut du bras), de l'essoufflement ou des battements cardiaques irréguliers (y compris un battement cardiaque rapide appelé syndrome de Wolff-Parkinson-White)? Souffrez-vous d'angine de poitrine? Avez-vous déjà souffert d'une maladie cardiaque ou vasculaire? Présentez-vous des antécédents

d'hémorragie cérébrale? Avez-vous déjà eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral?

- Présentez-vous des facteurs de risque de maladie cardiaque : hypertension, taux élevé de cholestérol, tabagisme, obésité, diabète ou antécédents familiaux prononcés de maladie cardiaque?
- Êtes-vous un homme de plus de 40 ans ou une femme ménopausée?
- Faites-vous de l'hypertension?
- Avez-vous déjà été forcé d'arrêter de prendre ce médicament ou tout autre médicament, en raison d'une allergie ou d'un autre problème?
- Prenez-vous un autre médicament contre la migraine qui soit un agoniste des récepteurs 5-HT₁, comme le succinate de sumatriptan, le chlorhydrate de naratriptan, le benzoate de rizatriptan, le malate d'almotriptan ou un médicament contre la migraine contenant de l'ergotamine, de la dihydroergotamine ou du méthysergide?
- Prenez-vous un antidépresseur, comme un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), tel que le chlorhydrate de fluoxétine, le chlorhydrate de sertraline, le malate de fluvoxamine, le chlorhydrate de paroxétine, etc., un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSN), tel que le chlorhydrate de venlafaxine, ou un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO), tel que le sulfate de phénelzine, le sulfate de tranlycypromine ou le moclobémide?
- Avez-vous déjà ressenti un engourdissement d'un côté du corps pendant que vous aviez un mal de tête?
- Avez-vous déjà fait de l'épilepsie ou eu des convulsions?
- Avez-vous déjà souffert d'une maladie du foie?
- Avez-vous plus de 65 ans?
- Le mal de tête dont vous souffrez actuellement est-il différent de vos migraines habituelles?
- Prenez-vous de la cimétidine (pour le traitement de troubles digestifs ou d'ulcères d'estomac) ou un antibiotique de la famille des quinolones (p. ex. ciprofloxacine)?

Comme pour les autres traitements contre la migraine, l'emploi excessif de ZOMIG pour vaporisation nasale peut causer des maux de tête chaque jour ou aggraver vos migraines. Parlez à votre médecin si vous croyez que c'est votre cas. Il est possible que vous deviez cesser d'utiliser ZOMIG pour vaporisation nasale pour corriger le problème.

Utilisation de ZOMIG pour vaporisation nasale pendant la grossesse :

Ne prenez pas ZOMIG pour vaporisation nasale si vous êtes enceinte, pensez l'être ou essayez de le devenir, ou si vous employez un moyen de contraception inadéquat, à moins d'en avoir discuté avec votre médecin.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Assurez-vous d'avoir mentionné au médecin ou au pharmacien tous les médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce que vous prenez, y compris :

- autres médicaments contre la migraine qui sont des agonistes des récepteurs 5-HT₁ (succinate de sumatriptan, chlorhydrate de naratriptan, benzoate de rizatriptan, malate d'almotriptan) ou des médicaments contre la migraine contenant de l'ergotamine, de la dihydroergotamine ou du méthysergide;
- antidépresseurs, comme un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), tel que le chlorhydrate de fluoxétine, le chlorhydrate de sertraline, le malate de fluvoxamine, le chlorhydrate de paroxétine, etc., un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSN), tel que le chlorhydrate de venlafaxine, ou un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO), tel que le sulfate de phénelzine, le sulfate de tranlycypromine ou le moclobémide;
- médicaments pour traiter les troubles ou les ulcères d'estomac (cimétidine);
- antibiotiques de la famille des quinolones (p. ex. ciprofloxacine);
- remèdes à base de plantes médicinales contenant du millepertuis.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou en avez pris récemment, même les médicaments sans ordonnance.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

DOSE HABITUELLE

Adultes

La dose habituelle est une seule vaporisation dans une narine.

Si le mal de tête disparaît après la dose initiale, puis revient, vous pouvez administrer une seconde dose, pourvu que 2 heures se soient passées depuis la première dose. Si la première dose n'a eu aucun effet sur votre migraine, ne prenez pas une deuxième dose sans consulter d'abord votre médecin.

Ne prenez pas plus de 10 mg de ZOMIG pour vaporisation nasale par période de 24 heures.

Le vaporisateur nasal ZOMIG se compose des parties suivantes :

Capuchon protecteur : Partie qui protège l'embout. Il faut l'enlever avant d'utiliser le vaporisateur nasal (figure 1A).

Embout : Partie que l'on insère dans la narine. Le médicament sort par le petit trou du dessus (figure 1B).

Appuie-doigts : Partie que l'on tient au moment d'utiliser le vaporisateur.

Piston : Partie que l'on pousse une fois que l'on a placé l'embout confortablement dans la narine. Le dispositif ne fonctionne qu'une seule fois.

Étapes du mode d'emploi du vaporisateur nasal ZOMIG (prière de lire toutes les étapes avant de commencer) :

1. Se moucher doucement avant de procéder. Enlever le capuchon protecteur (figure 1A). Tenir délicatement le vaporisateur nasal entre les doigts et le pouce comme sur l'illustration (figure 1B).

Ne pas enfoncer le piston tant que l'embout n'est pas placé dans la narine. Sinon, la dose sera perdue.



Figure 1

2. Boucher une narine, n'importe laquelle, en pressant fermement sur un côté du nez (figure 2).

Attendre avant d'enfoncer le piston. Prendre garde de ne pas vaporiser le médicament dans les yeux.



Figure 2

3. Placer l'embout (B) du vaporisateur nasal dans l'autre narine aussi profondément que possible, sans toutefois causer d'inconfort (figure 3). Relever légèrement la tête comme sur l'illustration ci-dessous. Aspirer légèrement par le nez et, en même temps, presser fermement sur le piston avec le pouce. Le piston peut sembler difficile à enfoncer et un dé clic pourrait se faire entendre.



Figure 3

Garder la tête légèrement relevée et sortir l'embout de la narine. Respirer doucement par la bouche pendant 5 à 10 secondes. Il pourrait y avoir du liquide dans le nez. C'est une sensation normale, qui disparaît rapidement.

SURDOSE

Si vous avez dépassé la dose prescrite par votre médecin, communiquez immédiatement avec lui, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison le plus proche.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Même si la grande majorité des personnes qui ont pris ZOMIG pour vaporisation nasale n'ont pas subi d'effets secondaires importants, vous devez quand même savoir que les effets secondaires suivants pourraient se manifester :

L'altération du goût est un effet secondaire très fréquemment signalé avec ZOMIG pour vaporisation nasale. Cet effet est normal et passera rapidement.

Effets secondaires fréquemment signalés avec ZOMIG pour vaporisation nasale :

- sensation de malaise général
- vomissements
- étourdissements
- fatigue
- faiblesse

ZOMIG peut fréquemment causer de la somnolence. Ne conduisez pas et ne faites pas fonctionner de machines si vous ressentez de la somnolence.

Parmi les autres effets secondaires fréquents figurent :

- douleurs musculaires
- difficulté à avaler
- sécheresse de la bouche
- maux de tête
- douleurs à l'estomac
- gêne au niveau du nez
- saignements de nez

Les effets secondaires peu fréquents comprennent :

- augmentation de la production d'urine ou de la fréquence des mictions

Avisez votre médecin à votre prochaine visite si vous éprouvez l'un de ces symptômes.

Les personnes qui souffrent de migraine peuvent courir le risque d'avoir des problèmes vasculaires cérébraux comme une hémorragie cérébrale ou un accident vasculaire cérébral. Comme c'est le cas avec d'autres médicaments de cette classe, des effets indésirables comme ceux-là ont été rapportés, quoique très rarement, en association avec la prise de zolmitriptan.

Dans de très rares cas, comme avec tout autre médicament de ce type (agonistes des récepteurs 5-HT₁), les effets secondaires suivants ont été signalés :

- spasmes dans les vaisseaux sanguins du cœur
- spasmes dans les vaisseaux sanguins du tube digestif et de la rate avec possibilité d'infarctus

Consultez le tableau suivant pour les mesures à prendre en cas d'effets secondaires graves.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES DE ZOMIG POUR
VAPORISATION NASALE :
FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE**

Symptôme/effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas	
Fréquent (fréquence supérieure ou égale à 1 % mais chez moins de 10 % des patients)			
Battements cardiaques irréguliers		√	
Sensation de douleur, de pression ou d'oppression dans la poitrine, le cou, la gorge, la mâchoire, les bras ou les jambes			√
Picotements, sensation de chaleur, de lourdeur ou de pression			√
Peu fréquent (fréquence supérieure ou égale à 0,1 % mais chez moins de 1 % des patients)			
Fréquence cardiaque rapide		√	
Hausse passagère de la tension artérielle		√	
Rare (fréquence supérieure ou égale à 0,01 % mais chez moins de 0,1 % des patients)			
Essoufflement, respiration sifflante, sensation de palpitations cardiaques, réactions allergiques incluant enflure des paupières, du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou du cou; ou encore éruptions cutanées, éruptions cutanées avec démangeaisons, boursoufflures, urticaire ou enflure avec liquide dans les tissus corporels			√
Très rare (chez moins de 0,01 % des patients)			
Symptômes de crise cardiaque (douleur à la poitrine, transpiration, essoufflement)			√
Douleurs abdominales soudaines ou intenses ou diarrhée sanglante			√

Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de ZOMIG pour vaporisation nasale, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Gardez votre médicament en lieu sûr, hors de la portée des enfants. En effet, ZOMIG pour vaporisation nasale peut être nocif pour les enfants. Conservez votre médicament à une température entre 15 et 30 °C, à l'abri de la chaleur directe.

Si votre médecin décide d'interrompre le traitement, rappelez les vaporisateurs non utilisés au pharmacien pour qu'il s'occupe de leur élimination. Ne prenez aucun médicament dont la date limite d'utilisation, indiquée sur l'emballage, est dépassée. Remettez ces vaporisateurs au pharmacien pour qu'il s'occupe de leur élimination.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

REMARQUE : La notice RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS contient l'information la plus récente au moment de l'impression.

On peut obtenir les renseignements les plus récents, ce document et la monographie complète du produit, rédigée pour les professionnels de la santé, à l'adresse : www.astrazeneca.ca, ou en communiquant avec AstraZeneca Canada Inc. au :

Renseignements – 1-800-461-3787

Cette notice a été préparée par AstraZeneca Canada Inc., Mississauga (Ontario) L4Y 1M4.

ZOMIG® est une marque déposée d'IPR Pharmaceuticals Inc., utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

Le logo d'AstraZeneca est une marque déposée d'AstraZeneca AB, utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

©AstraZeneca 1998 – 2019

Dernière révision : 11 décembre 2019